

CALCIUM -SANOSVIT SYROP 150 G

Cena: 11,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,114 g Ca ²⁺ /5ml
Postać	syrop
Producent	TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Calcii glubionate, Calcii lactobionas

Opis produktu

SANOSVIT CALCIUM syrop 150 ml
Glukonolaktobionian wapnia + Laktobionian wapnia

Głównymi składnikami syropu Sanosvit Calcium są dwie, dobrze przyswajalne, wapniowe sole organiczne. Wapń to minerał niezbędny do utrzymania prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej oraz równowagi wapniowo-fosforanowej organizmu. Uczestniczy w wielu reakcjach enzymatycznych i regulacyjnych. Odpowiada za gęstość mineralną kości i zębów, warunkuje ośrodkowe przewodnictwo nerwowe oraz dba o właściwą czynność skurczową mięśni. Zwiększając szczelność śródbłonna naczyń krwionośnych, ogranicza wysięk, dzięki czemu działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Jest też niezbędny w procesach krzepnięcia krwi.

Sanosvit Calcium - wskazania

Profilaktyka i uzupełnianie niedoborów wapnia w organizmie, np. w okresie osteoporozy, zmniejszonej ekspozycji na światło słoneczne, ciąży i laktacji.

Pomocniczo w czasie alergii.

Sanosvit Calcium - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Hiperkalcemia, hiperkalcuria.

Kamica nerkowa.

Galaktozemia lub cukrzyca.

Wiek poniżej 1. roku życia.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sanosvit Calcium - dawkowanie

Preparat do stosowania doustnego.

Unikać przyjmowania razem z produktami zbożowymi, mlekiem i jego przetworami oraz warzywami zawierającymi szczawiany. Syrop jest gotowy do spożycia, nie należy go rozcieńczać.

5 ml syropu zawiera 114 mg jonów wapnia.

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia:
15 ml syropu 2-3 razy na dobę.

Dzieci w wieku 6-12 lat:
10 ml syropu 2-3 razy dziennie.

Dzieci w wieku 1-26 lat:
5 ml syropu 2-3 razy w ciągu doby.

Nie przekraczać zalecanych dawek.
Sanosvit Calcium - działania niepożądane

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z jego potencjalnymi interakcjami z innymi substancjami czynnymi. Nie łączyć z antybiotykami z grupy tetracyklin.

Podczas przyjmowania zalecanych dawek ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych jest znikome.
Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.