


## HEEL NUX VOMICA KR. 30 ML.



Cena: 39,90 PLN

### Opis słownikowy

Postać	krop.doustne
Producent	BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

### Opis produktu

Nux vomica-Homaccord

Wskazania: Wspomagająco  
w łagodnych dolegliwościach trawiennych (wzdęcia, odbijania).

#### Skład

100 g kropli zawiera:

Strychnos nux-vomica 1)6 0,2g, Strychnos nux-vomica D10 0,2g, Strychnos nux-vomica D15 0,2g, Strychnos nux-vomica D30 0,2g, Strychnos nux-vomica 1)200 0,2g, Strychnos nux-vomica D1000 0,2g, Bryonia crética D4 0,2g, Bryonia crética D6 0,2g, Bryonia crética D10 0,2g, Bryonia crética D1 5 0,2g, Bryonia crética D30 0,2g, Bryonia crética D200 0,2g, Bryonia crética D1000 0,2g, Lycopodium clavatum D4 0,3g, Lycopodium clavatum D10 0,3g, Lycopodium clavatum D30 0,3g, Lycopodium clavatum D200 0,3g, Lycopodium clavatum D1000 0,3g, Citrullus colocynthis D4 0,3g, Citrullus colocynthis D10 0,3g, Citrullus colocynthis D30 0,3g, Citrullus colocynthis D200 0,3g.

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, etanol.

Zawiera 35% (v/v) etanolu.

#### Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zwykle po 5-10 kropli do 3 razy dziennie.

Krople można mieszać z niewielką ilością wody.

**Uwaga:**

Jeżeli objawy nie ustąpią lub nasilą się w ciągu 24 godzin należy koniecznie zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku pogorszenia objawów lub braku poprawy, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarskiej.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu).

**Stosowanie innych leków**

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.  
Stosowanie leku z jedzeniem i pić

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ze względu na brak wystarczających danych i zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci do lat 6. U dzieci od 6 do 12 lat produkt można stosować wyłącznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności z zalecenia lekarza.